

TFE3

KN VKTRO DKYAGNOSTKK

KULLANIM AMACI: VÁcut děíě tēbbŋ teíhi s

Bu ÁrÁn Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiŋ, ile g¼rÁntÁlenecek kalitatif immÁnohistokimya iŋin t

AÇIKLAMA: Transkripsiyon faktörü E3 (TFE3), temel heliks-loophelix fermuar transkripsiyon

ŪŋεoO ŋPŞσΩΩŞ ŋúúΩo £C9 °ŞΩΩ ¹ εoŋΨŋaŋΨŋ hÁcrelerinde ifade edilir ve ŋeŋitli genlerin dÁzenl tÁm¼rlerle iliŋkilidir ve TFE3 fÁzyon geni olan asin gen fÁzyonuyla iliŋkili b¼brek hÁcreli karsinomda ve ifade edilir.

KATALOG NO: PL2033

PL2033-R7 7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST

PL2033-R1 1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST

PL2033-1 1 ML KONS. 1/100 1000 TEST

PL2033-0,1 0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

BOYANMASI GEREKEN ALAN: Çekirdek

POZİTİF KONTROL: Testis (germ:hücreleri) veya Xp11 translokasyonu renal hücreli karsinom

AMBALAJ: 7 ml KullanĖma HazĖr (0.05 mol / L Tris - HCl, pH iŋeren seyreltilmiŋ 7 ml antikör.)

KAYNAK: TavĖan

KLON: ZR383

ANTİKÖR KONSANTRASYONU: ASİMON

TÜR REAKTİVİTESİ: 5ŋ~ŞoPŞoŋ úŞσú ŞŚŋPŞŚŋ

EPİTOP Bilinmiyor

MİKROBİYOLOJİK DURUM: steril deŋildir.

ÖN İŞLEM: malinle sabitlenmiŋ doku kesitlerinin boyalı iŋinde 10-20 dakika muamele edilmesini ve ardından o

PRİMER ANTİKÖR İNKÜBASYON SÜRESİ: 60 dakika

BOYAMA İPUÇLARI: Boyanma ŋok aŋksa, daha dÁĖĖk seyreltme ŋ. Eŋer boyanma ŋok gÁĖĖyse, ŋın iŋlemi kontı daha kĖsa sÁre kullanĖn.

SAKLAMA VE STABİLİTE: sodyum azid iŋerir ve 2-8ÁC'de etiketinde belirtilen son kullanma tar ŋnerildiŋi Ėekilde saklanmazsa, perfor

SORUN GİDERME: ŋiften e-posta ile Patolab Teknik Destek