Prame

ĶN VĶTRO DĶYAGNOSTĶK

KULLANIM AMACI : V¿cut dēкē tēbb´ teкhis

Bu ¿r¿n Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiк, ile gºr¿nt¿lenecek kalitatif imm¿nohistokimya i-in t

AÇIKLAMA :
Retinoik asit reseptºrleri RARA, RARB ve RARG aracēl transkripsiyonel baskēlayēcē gºrevi gºr¿r. Retinoik apoptozu ºnler. Bu gen, insan melanomlarēnda ºncelik tanēnan bir antijeni kodlar. Testis dēкēnda normal d

KATALOG NO : PL2032

PL2032-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
PL2032-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
PL2032-1	1 ML KONS. 1/100 1000 TEST
PL2032-0,1	0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

BOYANMASI GEREKEN ALAN : 4Ŝ]ΛΝŘŜ]Σ ăΛΰ2LJfI·Î Y I·Σ KÑŎΝŜ ěÑÎŜěΛΣ]Ν2Y2Î2YΣ D2fΞΛ I·èΞΡΰΡ

POZİTİF KONTROL : Testis ve Leya melanom

AMBALAJ : 7 ml Kullanēma Hazēr (0.05mol/L Tris-HCl, pH i-eren seyreltilmiк 7 ml antikor.)

KAYNAK : Tavкan

KLON : ZR383

ANTİKOR KONSANTRASYONU : Bilinmiyor

TÜR REAKTİVİTESİ : ÿãΠY E5ŜΝfŜΝΛ úŜăΰ ŜŘΛfY ŜŘΛΦ

EPİTOP : Bilinmiyor

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ¿r¿n: steril deĵildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmiк doku kesitlerinin boyan i-inde 10-20 dakika muamele edilmesini ve ardēndan o

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : Oda sēcaklēēnda 60 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma -ok a-ēksa, daha d¿кk¿k seyreltme Eĵer boyanma -ok g¿-l¿yse, ºn iкlemi kont daha kēsa s¿re kullanēn.

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ¿r¿n: sodyum azid i-erir ve 2-8ÁC'de etiketinde belirtilen son kullanma tar ºnerildiĵi кekilde saklanmazsa, perfor

SORUN GİDERME : Lütf:en e-posta ile Patolab Teknik Destek